

NAVA 75 WG УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

NAVA 75 WG сузбија следеће коровске врсте:

Користи се за сузбијање следећих корова:

- **вишегодишњи усколисни корови:** дивљи сирак из ризома (*Sorghum halepense*)
- **једногодишњи усколисни корови:** дивљи сирак из семена (*Sorghum halepense*), **коровско просо** (*Echinochloa crus-galli*), **мухар сиви** (*Setaria glauca*), **мухар зелени** (*Setaria viridis*), **сврачице** (*Digitaria sanguinalis*)
- **широколисни корови:** **теофрастова липица** (*Abutilon theophrasti*), **штир обични** (*Amaranthus retroflexus*), **пепељуга обична** (*Chenopodium album*), **штир бљутави** (*Amarantus blitoides*), **вијушац** (*Bilderdykia convolvulus*), **тарчужак** (*Capsella Bursa-pastoris*), **срцолисна пепељуга** (*Chenopodium hybridum*), **самоникли сунцокрет** (*Helianthus annuus*), **лубеничарка њивска** (*Hibiscus trionum*), **велики дворник** (*Polygonum lapatifolium*), **горушица пољска** (*Sinapis arvensis*), **чистац једногодишњи** (*Stachys annua*), **гавез** (*Symphytum officinale*).

Количина примене:

NAVA 75 WG се може примењивати само у меркантилном и силажном кукурузу, када је кукуруз у фази од 1-5 листа (фаза 11-15 BBCH скале). Користи се за сузбијање:

- **једногодишњих усколисних корова** – када су усколисни корови у фази 1 листа, а најкасније када су у фази бокорења, и **широколисних корова** када су у фази 2-4 листа, у количини **20 g/ha** односно **0,2 g/100 m² + 0,1 % оквашивача TREND 90 или EMULSON.**
- **вишегодишњих усколисних корова** – дивљи сирак из ризома (*Sorghum halepense*) када су травни корови у фази 3-5 листова (висине 10-15 cm) и **широколисних корова** када су корови у фази 2-4 листа, у количини **25 g/ha**, односно **0,25 g/100 m² + 0,1 % оквашивача TREND 90 или EMULSON.**

NAVA 75 WG користити уз обавезан додаток оквашивача Trend 90 или Emulson у концентрацији 0,1% (100 ml у 100 l воде). Тако се постиже оптимална фолијарна апсорпција и боља ефикасност.

Количина течности по јединици површине: 200 – 400 l воде/ха (2 -4 l на 100 m²)

Максималан број третирања у току године: На истој површини може се применити једном.

Време примене:

Примењује се у раној фази ницања корова, усколисни корови у фази 1 листа, широколисни 2-4 листа. Кукуруз у фази 1-5 листа, фаза 1-15 BBCH скале.

Напомене

- где се у време сетве користе системични органофосфорни инсектициди, не користити **NAVA 75 WG** јер ће умањити деловање препарата. Такође не користити фолијарне органофосфорне инсектициде од 7 дана пре нити до 4 дана након примене **NAVA 75 WG**
- **NAVA 75 WG** се не сме примењивати у усеву семенског кукуруза, кукуруза шећерца и кукуруза кокичара
- ако температура у ноћи пре примене падне испод 6°C, или ако се у дану примене или наредног дана очекује температура преко 25°C одложити примену **NAVA 75 WG**
- не примењивати на касно сејан кукуруз (крај јуна)
- не примењивати уколико је кукуруз формирао више од 5 листова
- не примењивати уколико је усев под стресом
- не примењивати у кукурузу са подусевом (пасуљ, бундеве и сл.)
- једно култивирање се препоручује десетак дана након примене **NAVA 75 WG**
- не примењивати, не чистити, нити испирати прскалицу близу жељене вегетације, нити на местима где хемикалије могу доћи у додир са њиховим корењем. Не примењивати на травњаке, стазе и путеве
- не третирати биљке влажне од росе или кише

Начин употребе и припреме препарата:

Прскање и или заливање се може вршити леђним или тракторским прскалицама. Одмерену количину препарата сипати у резервоар прскалице до пола напуњен водом. Затим уз добро мешање резервоар допунити водом. На крају додати оквашивач Trend 90 или Emulson. Наставити са мешањем и за време прскања. Употребити раствор одмах или најкасније у року од 24 h, јер може доћи до смањења ефикасности, због разградње препарата. Пре поновне употребе, раствор добро промешати.

Пиликом рада са препаратом не пушити, јести и не пити потребно је носити одговарајућу заштитну одећу и рукавице. Приликом примене препарата треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију водотока, река, бунара, језера, и изворишта вода третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

Каренца: Обезбеђена временом примене.

Радна каренца: не улазити у третирано поље док се препарат не осуши.

Могућност мешања са другим пестицидима:

Не сме се мешати са органофосфорним инсектицидима. Може се мешати са препаратима на бази дикамбе.

Усеви који се могу сејати у нормалном плодореду (после примене пестицида):

Исте календарске године може се сејати озима пшеница и трава.

Усеви који се могу сејати ако дође до преоравања после примене хербицида

Може се сејати само кукуруз.

Фитотоксични ефекти за биљке које се третирају:

Ако се користи према наведеном упутству за употребу, **NAVA 75 WG** не изазива фитотоксичне ефекте.

Мере предострожности при руковању препаратом и при његовој примени:

Приликом руковања треба се придржавати општих мера предострожности. Обезбедити заштиту коже и слузница, радити у проветреном простору, носити полумаску за фину прашину. За време рада са препаратом не јести, пити ни пушити.

NAVA 75 WG је штетан за човека и отрован за водене организме и спада у III групу отрова.

Ознаке упозорења односе се на врсту ризика који постоје или могу настати у промету отрова и при руковању отровима, а обележавају се словом R.

R-22 Штетан ако се прогута.

R-52/53 Штетан за водене организме, може проузроковати дуготрајна нежељена дејства на водену средину.

Ознаке обавештења односе се на мере које се морају применити у промету отрова и при руковању отровима, а обележавају се словом S.

S-2 Чувати ван домашаја деце.

S-13 Чувати одвојено од хране, пића и сточне хране.

S-36/37/39 носити одговарајућу заштитну одећу, рукавице и заштитна средства за очи/лице.

S-45 У случају незгоде или у случају мучнине одмах потражити савет лекара (ако је могуће показати етикету).

Симптоми тровања, прва помоћ, противотров и лечење:

Симптоми

У случају тровања **NAVA 75 WG**, симптоми тровања нису специфични, али се зна да може да изазове неке опште симптоме и знаке тровања као што су: мука, гађење, малаксалост, главобоља, а некада и повраћање. Изазива црвенило и свраб коже и иритацију слузница очију и дигестивног тракта, што се манифестује црвенилом коњуктива и сузењем, хиперсалвацијом, гребањем у грлу и болом у трбуху.

Прва помоћ и лечење

Напомена лекару: не постоји специфични антидот, лечење је симптоматско.

У случају да средство доспе у организам:

- перорално (гутањем), не изазивати повраћање без савета лекара. Не давати ништа у уста особи у несвести.

Консултовати лекара у озбиљнијим случајевима.

- перкутано (додир са кожом): неопходно је купање са довољно сапуна и воде. Уклонити сву контаминирану одећу и обућу. Консултовати лекара ако је потребно.

- у додиру са очима: испрати одмах са пуно воде, такође и испод капака, најмање 15 минута. Консултовати лекара ако је потребно.

- у случају удисања, изаћи на свеж ваздух. Давати кисеоник или вештачко дисање ако је потребно. Консултовати лекара уколико је дошло до значајног излагања.

Лечење подразумева рехидратацију са надокнадом електролита и антихистаминика по потреби.

У случају тровања за ближа упутства о лечењу консултовати **центар за контролу тровања ВМА** Црнотравска 17, Београд тел. **011/662-381; 661-122 лок. 31-440, 26-156, 31-897.**

Складиштење: Препарат чувати ван места становања, под кључем, ван домашаја деце и неупућених особа, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на сувом месту, са добром вентилацијом одвојено од хране, пића, и сточне хране.

Одстрањивање празне амбалаже: Празну амбалажу испрати водом (најмање три пута) и течност додати у танк прскалице, након тога је избушити (на три места) да би се учинила неупотребљивом. Празну амбалажу и остатке средста не бацати у водотокове, канализацију, септичке јаме, депоније да не би дошло до загађења човекове околине, већ их депоновати на места одређена за прикупљање и уништавање отпадних материја ове врсте (овлашћени сабирни центри).