

BUZZ ULTRA DF

(tebukonazol 750 g/kg)

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

BUZZ ULTRA се примењује као фунгицид за сузбијање проузроковача црне пегавости кромпира (*Alternaria solani*)

Количина примене: 0, 25 kg/ha (25 g на 100 m²)

Количина течности по јединици површине: 300 - 400 l/ha

Максималан број третирања у току године: На истој површини у току године може се применити три пута.

Време примене:

а) кромпир, током вегетације превентивно (BVCH 19-71), пре стицања услова за заражавање.

Начин употребе и припреме препарата:

Прскање се може вршити леђним или тракторским прскалицама. Одмерену количину препарата сипати у резервоар прскалице до пола напуњен водом. Затим уз добро мешање резервоар допунити водом. Пиликом рада са препаратом не пушити, јести и не пити потребно је носити одговарајућу заштитну одећу и рукавице. Приликом примене препарата треба поштовати водозащитне зоне и спречити контаминацију водотока, река, бунара, језера, и изворишта вода третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

Каренца: 14 дана за кромпир.

Радна каренца: до сушења депозита. Приступ домаћих животиња, није дозвољен до истека каренце.

Фитотоксичност: Није фитотоксичан по биљке које се третирају.

Могућност мешања са другим пестицидима: Може се мешати са препаратима на бази циперметрин, ципродинил, дифеноконазолом, каптан, металаксилум, сумпором.

Немогућност мешања са другим активних материја:

Не може се мешати са изразито алкалним препаратима.

Усеви који се могу сејати у нормалном плодореду (после примене пестицида):

Слободна је сетва свих култура.

Мере предосторожности при руковању препаратом и при његовој примени:

Приликом руковања треба се придржавати општих мера предосторожности. Обезбедити заштиту коже и слузница, радити у проветреном простору, носити полумаску за фину прашину. За време рада са препаратом не јести, пити ни пушити.

Ознаке ризика односе се на врсту ризика који постоје или могу настати у промету отрова и при руковању отровима, а обележавају се словом R.

R- 63 – Могућ ризик од штетног деловања на плод.

R-50/53 – Веома токсично по водене организме, може изазвати дуготрајне штетне ефекте у воденој животној средини.

Ознаке безбедности односе се на мере које се морају применити у промету отрова и при руковању отровима, а обележавају се словом S.

S-2 Чувати ван домаћаја деце.

S-13 Чувати одвојено од хране, пића и сточне хране.

S-35 Хемиклаије и контејнери морају бити одлежени на сигуран начин.

S-36/37/39 Носити одговарајућу заштитну одећу, рукавице и заштитна средства за очи /лице.

S-46 Ако се прогута, хитно затражити лекарску помоћ и показати етикету или амбалажу.

S-57 Користити одговарајућу посуду да се избегне загађивање околине.

Симптоми тровања, прва помоћ, противотров и лечење:

Симптоми

Нису описана тровања код људи. У акутним тровањима животиња и ретким акутним тровањима људи запажени су општи знакови тровања мука, гађење, малаксалост, главобоље а понекад и повраћање. Може да изазове црвенило и свраб коже, иритацију слузница очију и дигестивног тракта, што се манифестује црвенилом коњуктива, сузењем, хиперсаливацијом, гребњем у гуши и болом у трбуху.

Прва помоћ и лечење:

У случају пероралних тровања треба изазвати повраћање и испрати уста са већом количином воде, потражити помоћ лекара, ради се лаважу желуца.

Уколико дође до контаминације очију, одмах испрати очи са чистом водом у трајању од најмање 15 мин. Потражити савет лекара.

Уколико дође у контакт са кожом, одмах скинути сву контаминирану одећу. Кожу прво опрати са већом количином воде, а потом сапуном и водом.

Контаминирана одећа мора бити опрана пре поновне употребе. Ако је контаминација била велика и ако се иритација и даље осећа треба потражити савет лекара.

У случају инхалационог тровања, затрованог изнети из контаминиране атмосфере, утоплити га. Обезбедити медицински надзор.

Лечење је симптоматско.

**У случају тровања за ближа упутства о лечењу консултовати центар за контролу тровања
ВМА Црнотравска 17, Београд тел. 011/3608-440 или 662-381.**

Складиштење: Препарат чувати ван места становања, под кључем, ван домаћаја деце и неупућених особа, у добро затвореној оригиналној амбалажи, на сувом месту, са добром вентилацијом одвојено од хране, пића, и сточне хране.

Поступак у случају несреће: У случају несреће и расипања садржаја врећица обавезно користити одговарајућу заштитну опрему (заштитне рукавице, наочаре, одело и чизме). Удаљити сва непотребна лица са места несреће, изоловати место и онемогућити неовлашћен улаз на место несреће. Садржај не спирати у канализацију и друге водтокове. Лагано наквасити расути производ да се не би стварала прашина. Пажљиво покупити сав расути садржај и ставити га у одговарајуће контејнере. Контејнере добро затворити и садржај уништити у сабрином центру за уништавање опасног отпада.

Чишћење прскалица и заштитне одеће

После завршене примене препарата сва опрема (машине и заштитна одећа) мора да се темељно очисти. У резервоар прскалице треба додати воде добро испрати и са тим садржајем испрскати део већ третиране површине. После тога добро испрати распрскиваче и црева за довод препарата. Опрати са минималном количином воде спољашност апарата за примену. После прања оставити да се све добро осуши и однети у просторије за чување пољопривредне механизације. Заштитну одећу опрати са детерџентом и добро испрати са већом количином воде.

Одстрањивање празне амбалаже: Празну кесицу поцепати да би се учинила неупотребљивом. Остатке празне амбалаже и остатке средства не бацати у водотокове, канализацију, септичке јаме, депоније да не би дошло до загађења човекове околине, већ их депоновати на места одређена за прикупљање и уништавање отпадних материја ове врсте (овлашћени сабирни центри).

**Дозвола републичког Министарства Пољопривреде, шумарства и водопривреде
бр. 321-01-1507/2013-11 од 16.10.2013.**

Произвођач: Sulphur mills limited, 604/605, 349, Business Point, Western exp. Highway, Andheri-E, Mumbai – 400 069 India

Заступник: Агролинк д.о.о. Џорџа Вашингтона 54, Београд.